

BB10

10 mg

Wolverine - BPC-157 + TB-500

1 RECONSTITUCION DEL VIAL

Toma tu vial de **BB10 Wolverine (10 mg)** en polvo y agrega **3 ml de agua bacteriostatica (BAC water)**. Inyecta el agua lentamente por la pared interna del vial. No agites: gira suavemente entre las palmas hasta que quede transparente.

Resultado: 3 ml de solución, con concentración de **3.33 mg por ml** (1 unidad de jeringa de insulina = aprox. 0.033 mg).

2 OPCIONES DE DOSIS DIARIA

Wolverine se aplica **una vez al día**. La dosis **depende por completo del nivel de malestar, inflamación o dolor** del paciente. A mayor malestar, mayor dosis.

MICRODOSIS

10 u

0.33 mg

30 dosis
diarias

INTERMEDIA

20 u

0.67 mg

15 dosis
diarias

INTENSIVA

30 u

1.0 mg

10 dosis
diarias

Microdosis (10 u): dolores de espalda, molestias de la edad, mantenimiento. - **Intermedia (20 u):** dolores recurrentes, inflamación media. - **Intensiva (30 u):** ligamentos, tendones y heridas por lesiones, post-operatorio.

3 FRECUENCIA Y APLICACION

Aplica **1 dosis diaria** a la misma hora, todos los días, hasta terminar el vial. Vía **subcutánea**, preferentemente **cerca de la zona lesionada**.

APLICACION

1 vez al día

VIA

Subcutanea

4 AREAS DE APLICACION

Para mayor efecto, aplica cerca de la zona lesionada cuando sea posible. Rota el sitio en cada aplicación para evitar irritación.

ABDOMEN

A 2 dedos alrededor del ombligo

BRAZO

Parte trasera (tríceps)

PIERNA

Parte media externa (muslo)

5 CONSERVACION Y DESCARTE

Reconstituido: **refrigerado 2-8 grados C**, sin congelar, protegido de la luz. **Vida útil reconstituida: 6 semanas**.

Descarta el vial a las 6 semanas de haberlo reconstituido, incluso si todavía contiene líquido.