

# BBG70

70 mg

Glow

## 1 RECONSTITUCION DEL VIAL

Toma tu vial de **BBG70 Glow (70 mg)** en polvo y agrega **3 ml de agua bacteriostatica (BAC water)**. Inyecta el agua lentamente por la pared interna del vial - nunca directo sobre el polvo. No agites: gira suavemente entre las palmas hasta que la solucion quede completamente transparente.

**Resultado:** 3 ml de solucion lista para usar, con una concentracion de **23.3 mg por ml**.

## 2 DOSIS DIARIA

Usa una **jeringa de insulina (100 unidades = 1 ml)** y carga la dosis indicada. En esa jeringa, cada raya pequena representa 1 unidad.

# 10 unidades

EQUIVALE A  
**2.3 mg al dia**

## 3 FRECUENCIA Y DURACION

Aplica **1 dosis diaria** de 10 unidades, todos los dias, durante **1 mes completo**. Manten un horario fijo (siempre en la manana o siempre en la noche) para mejores resultados.

APLICACION  
**1 vez al dia**

CICLO  
**30 dias**

## 4 AREAS DE APLICACION

La inyeccion es **subcutanea** (justo debajo de la piel). Rota el sitio en cada aplicacion para evitar irritacion.

### ABDOMEN

A 2 dedos alrededor del ombligo

### BRAZO

Parte trasera (triceps)

### PIERNA

Parte media externa (muslo)

## 5 CONSERVACION Y DESCARTE

Una vez reconstituido, guarda el vial **refrigerado entre 2 grados C y 8 grados C**. Protegelo de la luz directa y no lo congeles. **Vida util reconstituida: 6 semanas**.

**Descarta el vial a las 6 semanas** de haberlo reconstituido, incluso si todavia contiene liquido. Despues de ese tiempo el peptido pierde estabilidad y no debe usarse.