

GHK50

GHK-Cu · Cobre GHK

1 RECONSTITUCIÓN DEL VIAL

Toma tu vial de **GHK-Cu (50 mg)** en polvo y agrega **3 ml de agua bacteriostática (BAC water)**. Inyecta el agua lentamente por la pared interna del vial, nunca directo sobre el polvo. No agites: gira suavemente entre las palmas hasta que la solución quede transparente.

Resultado: 3 ml de solución con una concentración de **16.67 mg por ml**. La solución toma un color **azul** característico del cobre; es normal. (1 unidad de jeringa de insulina = 0.1 ml).

2 DOSIS DIARIA

Usa una **jeringa de insulina (100 unidades = 1 ml)** y carga la dosis indicada. En esa jeringa, cada raya pequeña representa 1 unidad.

10 unidades

EQUIVALE A

1.67 mg al día

3 FRECUENCIA Y DURACIÓN

Aplica **1 dosis diaria de 10 unidades**, todos los días, durante **1 mes completo**. Mantén un horario fijo (siempre en la mañana o siempre en la noche) para mejores resultados. Con esta dosis el vial rinde exactamente 30 días.

APLICACIÓN
1 vez al día

CICLO
30 días

4 ÁREAS DE APLICACIÓN

La inyección es **subcutánea** (justo debajo de la piel). Rota el sitio en cada aplicación para evitar irritación.

ABDOMEN

A 2 dedos alrededor del ombligo

BRAZO

Parte trasera (tríceps)

PIERNA

Parte media externa (muslo)

5 CONSERVACIÓN Y DESCARTE

Una vez reconstituido, guarda el vial **refrigerado entre 2 °C y 8 °C**, protegido de la luz directa y sin congelar. **Vida útil reconstituida: 6 semanas.**

Descarta el vial a las 6 semanas de haberlo reconstituido, incluso si todavía contiene líquido. Después de ese tiempo el péptido pierde estabilidad y no debe usarse.

Material exclusivamente informativo. Consulta con un profesional de la salud antes de iniciar cualquier protocolo.

GLOW CODE