

KLOW

GHK-Cu + KPV + BPC-157 + TB-500

1 RECONSTITUCIÓN DEL VIAL

Toma tu vial de **Klow (80 mg)** en polvo y agrega **3 ml de agua bacteriostática (BAC water)**. Inyecta el agua lentamente por la pared interna del vial. No agites: gira suavemente entre las palmas hasta quedar transparente.

Resultado: 3 ml de solución, concentración de **26.67 mg por ml** (1 unidad de jeringa de insulina $\approx$ 0.267 mg).

2 DOSIS DIARIA

Klow se aplica **una vez al día**. Dosis estándar: **10 unidades** de jeringa de insulina por aplicación.

10 u

dosis diaria

30

dosis por vial

Cada vial de 80 mg reconstituido en 3 ml rinde **30 dosis** de 10 unidades — aprox. 1 mes a 1 aplicación por día.

3 FRECUENCIA Y APLICACIÓN

Aplica **1 dosis diaria** a la misma hora, todos los días, hasta terminar el vial. Vía **subcutánea**.

APLICACIÓN

1 vez al día

VÍA

Subcutánea

4 ÁREAS DE APLICACIÓN

Rota el sitio en cada aplicación para evitar irritación.

ABDOMEN

A 2 dedos alrededor del ombligo

BRAZO

Parte trasera (tríceps)

PIERNA

Parte media externa (muslo)

5 CONSERVACIÓN Y DESCARTE

Reconstituido: **refrigerado 2–8 °C**, sin congelar, protegido de la luz. **Vida útil: 6 semanas**.

Descarta el vial a las 6 semanas de reconstituido, incluso si todavía contiene líquido.