

TESA5

Tesamorelina · Análogo de GHRH

1 RECONSTITUCIÓN DEL VIAL

Toma tu vial de **tesamorelina (5 mg)** en polvo y agrega **2 ml de agua bacteriostática (BAC water)**. Inyecta el agua lentamente por la pared interna del vial, nunca directo sobre el polvo. No agites: gira suavemente entre las palmas hasta que la solución quede transparente.

Resultado: 2 ml de solución con una concentración de **2.5 mg por ml**. La solución debe quedar transparente e incolora. (100 unidades de jeringa de insulina = 1 ml).

2 DOSIS DIARIA

Usa una **jeringa de insulina (100 unidades = 1 ml)** y carga la dosis indicada. En esa jeringa, cada raya pequeña representa 1 unidad.

40 unidades

EQUIVALE A
1 mg al día

3 FRECUENCIA Y DURACIÓN

Aplica **1 dosis diaria de 40 unidades**, todos los días. Mantén un horario fijo; se recomienda aplicarla por la noche con el estómago vacío. Cada vial de 5 mg rinde **5 días**; para un ciclo mensual necesitarás 6 viales.

APLICACIÓN
1 vez al día

RINDE POR VIAL
5 días

Tip: acompaña el protocolo con ejercicio regular (fuerza + cardio) para potenciar los resultados. Evita los carbohidratos justo alrededor de la inyección nocturna.

4 ÁREAS DE APLICACIÓN

La inyección es **subcutánea** (justo debajo de la piel). Rota el sitio en cada aplicación para evitar irritación.

ABDOMEN

A 2 dedos del ombligo

BRAZO

Parte trasera (tríceps)

PIERNA

Parte media externa (muslo)

5 CONSERVACIÓN Y DESCARTE

Una vez reconstituido, guarda el vial **refrigerado entre 2 °C y 8 °C**, protegido de la luz directa y sin congelar.

Usa la solución dentro de su ventana de estabilidad y descártala si se vuelve turbia o cambia de color. Sigue la indicación del fabricante o proveedor sobre la vida útil tras reconstituir.